

¿Que puede un padre o un cuidador de niños aser?


El primer paso en intentar de consolar el llanto de un bebé es acer fuerza encontrar las necesidades de un bebé – asistir, cambiar, o detener al bebé. Ay otras estrategias que pueden usarse para calmar el bebé y al cuidador del bebé:

- Meciendo
- Caminando
- Llevar a pasiar
- Palpar
- Llamar a un amigo -a- o miembro de familia para soporte
- Musica
- **Mas importante:** poner al bebé en un lugar seguro como en su cuna y usar el tiempo para calmarse antes de intentar de consolar al bebé. Esta bien si deja al niño llorar si la persona a echo esfuerzo de calmarlo dandole las necesidades del bebé. Si el llanto sigue por largo tiempo, entonces el bebé debe ser examinado por un medico para estar seguro que no tenga enfermedad o dolor que causa que llore el niño.

¿A donde puede ir por soporte y informacion adicional?


La Alianza de Bebé Sacudido, 817-882-8686, mantene un base de datos de otras familias victimas, que desean ofrecer soporte. Tambien ay un grupo de soporte que tiene conexión en el internet para familias y profesionales. Mas información esta a la mano en el web sitio: <http://www.shakenbaby.com> or e-mail to info@shakenbaby.com.

Padres o cuidadores que estan luchando con sus niños pueden recibir ayuda y consejo en: CHILDHELP – 800-4-ACHILD or The National Child Abuse Hotline – 800-422-4453.



Nunca, Nunca sacudan un bebé!

Para más información acerca del Síndrome de Bebé Sacudido



Parent Information Center

500 W. Lott St, Suite A
Buffalo, WY 82834
1-800-660-9742 (WY only)
(307) 684-2277 (v/tdd)
(307) 684-5314 (fax)

Correo Electrónico: tdawson@wpic.org

Sitio Web: www.wpic.org

Para hablar con el

Enlace de Padres en la Comunidad PIC
en su área, contacte a:

Los contenidos de este folleto fueron desarrollados con fundamos del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Sin embargo, los contenidos no necesariamente representan el reglamento del Departamento de Educación y no se debe de asumir la aprobación del Gobierno Federal.

Síndrome de Bebé Sacudido

Folleto de Discapacidad #18



Centro de Información para Padres

1-307-684-2277

Un proyecto de
Padres ayudando a padres
de Wyoming, Inc.

¿Que es Síndrome de Bebé Sacudido?

“Síndrome de Bebé Sacudido” (SBS) es un término que se usa para describir la colección de señales y síntomas resultando de un niño que fue sacudido violentamente. Es una adquirida herida del cerebro que es causada cuando un adulto agarra a un bebé o niño del tronco o de los brazos y lo sacude de atrás a adelante en modo de mover bruscamente. La mayor de casos ocurren en niños bajo la edad de un año, aunque ayan documentado casos en niños asta la edad de cinco años.

Heridas que amenazan la vida pueden ocurrir durante la sacudida porque los músculos del cuello de un bebé faltan de la fuerza para controlar los movimientos de su cabeza. Un bebe es extremadamente vulnerable a las heridas que ocurren de una moción de latigazo.

Uno de cuatro bebés sacudidos mueren del resultado de este abuso o maltrato. Trauma de la cabeza es la causa mas frecuente de daño permanente o muerte entre bebés y niños abusados, y cuentos de sacudidos en numeros significativos de esos cuentos. Una estimación de 50,000 casos de SBS ocurren cada año en Los Estados Unidos. Mas de sesenta porciento de victimas son hombrés.

Bebés sacudidos a veces son diagnostiados con SBS como impacto de heridas semejante a fracturas del crañeo que ocurren cuando un niño a sido tirado o sacudido.

¿Que son las sintomas de SBS?

Mientras datos en resultados son limitados, estudios indican que menos de 10-15 por ciento de bebés sacudidos recuperan completamente. El grado de daño del crañeo depende en el numero y duración de la sacudida y la fuerza envuelta en el impacto de la cabeza. De modo que síntomas escalan de moderado a severo. Moderado o mas delicados síntomas pueden ser extraviados o diagnóstico equivocado y an sido meno difinitivos, sin embargo inmediata atención medica puede ayudar a reducir el afecto de sacudir. Ay tres indicadores común que se encuentran en casos mas moderado o severos de SBS:

- Hematoma subdural (colección de sangre de entre el crañeo y el cerebro)
- Edema cerebral (hinchazón del crañeo)
- Hemorragia de retina (sangramiento de atras del ojo)

Incontrable hinchazón del cerebro es considerado el mas común caso de muerte en niños que sufren de SBS. Sangramiento detras de los ojos es la causa de parcial o completa pierda de vista entre sobrevivientes :

Resultados de tolerables casos de SBS pueden ser:

- Desarrollados atrasos
- Desorden de ataque repentino
- Incapacidad de aprender
- Cambios de personalidad
- Problemas de conducta
- Parcial pierda de vista
- Alimentación de deglución
- Irritabilidad
- Náusea y vomitos
- Letargo

Moderado a sévero SBS puede resultar en:

- Ataque repentino/convulsiones
- Coma/cambio en estado consiente
- Problemas respirando
- Letargo extremo (somnolencia o inactividad)
- Parálisis
- Pupilos fijos/mirada cristal
- Fractura de huesos en las costilla por causa de detener fijo del tronco.
- Fractura de huesos del crañeo por causa de impacto de herida
- Larga fractura de hueso (brazos y piernas)
- Separación de la retina (estrato interior del ojo separandolo del resto del globo ocular)
- Rasgamiento de tejidos del cerebro de un niño (atonol esquilar)
- Completa pierda de visión
- Parálisis cerebral
- Estado vegetativo permanente
- Muerte

¿Quien sacude a un bebé y porque?

Hombres tienen tendencia de infligir daño por sacudir bebés en 65-90% de casos. Hombres adultos en los veinte años de edad que son el padre del bebé o novio de la madre son los que sacuden. Hembras que lastiman su bebé por causa de sacudir son cuida niños o proveedoras del cargo de niños. Sin embargo es importante recordar que cualquiera persona cuando confrontado con un bebé inconsolable, falta de dormir y estres de por fuera pueden ser riesgo para peligro y conducto impulsivo.

Llanto es el unico modo que un bebé tiene para decir que ocupan algo, como comida, ser cambiados o agarrarlos. Llanto es un sonido muy fastidioso que sopone de ser. Si fuera un sonido agradable, el llanto seria facil ignorar y las necesidades de un bebé nunca tomarian atención. Llanto a veces puede aparecer constante y vacío de razón racional, semejante a bebés que tienen colico.

Llanto es la razón numero uno que bebés son sacudidos. Una persona en cuidado de un bebé que esta estresada tiene muy difícil tiempo calmando el llanto de un bebé. Falta de dormir y otro estrés de la vida pueden aumentar emociones de desamparo y frustración. Ironicamente el abuso de sacudir puede ser a si mismo reforzado porque el niño que es sacudido puede parar de llorar por causa de herida infligida.

¿Como puede SBS ser diagnosticado?

Síndrome de bebé sacudido es a veces difícil a reconocer y mucho mas difícil de provar. La razón es que bebés que son sacudidos frecuentemente no enseñan señales exterior de abuso y este tipo de abuso generalmente ocurre en la ausencia de un testigo. Un CT (tomografía computada) escán o MRI (imagenes por resonancia magnetica) de la cabeza pueden detectar hematoma subdural. Un examen simple del ojo puede detectar la presencia de hemorragia de la retina. Fractura de huesos se ven en radiografías convencional.

No ay respuestas firme para la exacta fuerza y numero de sacudos necesarios para causar herida, sin embargo profesionales medicos condicen que heridas por sacudir es frecuentemente tan violento que cualquier observador razonable puede reconocer que es peligroso para un niño.

La presencia de común indicadores, con o sin otros síntomas, no es facilmente confundido con excusas comunes semejante a caidas, ahogarse, enfermedad, o sacudir para resucitar. Síndrome de Bebé Sacudido es completamente preventivo. Un niño severamente herido indica una familia herida, cuando las vidas de los padres y hermanitos de las victimas de SBS son permanente reformadas si el niño sobrevive o muere. A la vez que células del cerebro son dañadas, nunca pueden ser regeneradas o reemplazados.